



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

بیمارستان شهید بهشتی قروه

آموزش به بیمار با موضوع: راهنمای مصرف داروی پلاویکس



تهیه کنندگان: گروه آموزش به بیمار

تأیید کننده علمی: خانم دکتر محدثه موسوی
(دکتری داروسازی)

بهمن ۱۴۰۱

در صورت بروز هریک از این علائم فوراً به پزشک مراجعه کنید

تشنج - غش - سردرد شدید ناگهانی - گیجی - تب
ضعف یا خستگی غیر معمول - مشکل در صحبت کردن
ضربان قلب سریع - تغییرات بینایی - خونریزی کنترل
نشده از لثه یا بینی رنگ پریدگی شدید پوست - زردی
چشم یا پوست - لکه‌های بنفش پوستی درد شدید معده
یا شکم - **استفراغ** شبیه همراه با خون یا شبیه کف قهوه
مدفوع خونی یا سیاه - **ادرار خونی**، قرمز، صورتی یا تیره
علائم مشکلات کلیوی (مانند تغییر در مقدار ادرار)
احساس سنگینی و درد در قفسه سینه که به بازو یا شانه
کشیده می شود. در صورت بروز علائم واکنش‌های
آلرژیک مانند تنگی نفس، **سرگیجه** شدید،
بثورات پوستی، خارش، ورم (به ویژه صورت، زبان یا گلو)
فوراً به اورژانس مراجعه نمایید یا با ۱۱۵ تماس بگیرید.

نخ: داروهای ژنیک دکتر فاطمه تومر و بهاران - پاپ ششم

بزرگه از سایت: Medseape.com

بزرگه از سایت: Drugs.com



با آرزوی سلامتی و تندرستی

- قبل از مصرف کلوییدوگرل اگر به آن یا داروهای مشابه
ضد پلاکت آلرژی داریده پزشک خود بگویید.

- قبل از استفاده از این دارو، موارد زیر را به پزشک خود
اطلاع دهید:

- سابقه شرایط خونریزی (مانند زخم معده، کولیت
اولسراتیو، خونریزی در مغز، چشم)، سکنه مغزی، جراحی
اخیر، آسیب جدی یا تروما، بیماری کبدی، کلیوی،
بیماریهای خونریزی دهنده (مانند هموفیلی)

- به طور کلی تمام داروهای را که مصرف می کنید به
اطلاع پزشک خود برسانید .

- به خصوص داروهای رقیق کننده خون (مانند وارفارین یا
کومادین، ریواروکسابان)

- داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند: (مفنامیک
اسید آسپرین ، ایبوپروفن ، ناپروکسن،

دیکلوفناک، ایندومتاسین و ملوکسیکام) داروهای ضد
افسردگی مانند فلوکستین (پروزاک)، دولوکستین،

پاروکستین، ترازودون)

اس امپرازول، لنزوپرازول، امپرازول، پنتوپرازول، رابپرازول
- در صورت تداوم یا بدتر شدن، هریک از عوارض زیر،

خونریزی یا کبودی - ناراحتی یا درد معده - اسهال -
یبوست در اسرع وقت با پزشک مشورت نمایید:

- داروی پلاویکس در موارد نادر ممکن است باعث
خونریزی جدی در معده، روده، چشم یا مغز و یا باعث

اختلال خونی بسیار جدی شود و علائم آنها ممکن است
هر زمانی پس از شروع این دارو ظاهر شود.

پلاویکس

قرص پلاویکس که با نام داروی کلوپیدوگرل هم شناخته می شود. یک داروی ضد پلاکت است که با جلوگیری از چسبیدن پلاکت‌ها به یکدیگر عمل کرده و از تشکیل لخته‌های مضر جلوگیری می‌کند.

برای پیشگیری حملات قلبی و سکتته در اشخاص مبتلا به حمله ی قلبی (اخیرا دچار حمله شده)، کسانی که اخیرا سکتته مغزی کرده، یا افراد مبتلا به بیماری گردش خون استفاده میشود. همچنین از آن برای درمان درد قفسه سینه (حمله قلبی جدید، آنژین ناپایدار) و باز نگه داشتن رگهای خونی و پیشگیری از لخته شدن خون بعد از عملهای خاص (مانند کارگذاری استنت قلب) استفاده میشوند.

توصیه های خودمراقبتی به بیمار

* دوز و طول مدت درمان به شدت ناراحتی و واکنش‌ها به درمان بستگی دارد. اگر برای پیشگیری از لخته شدن خون بعد از کاشت استنت یا عملهای دیگر این دارو را مصرف میکنید آن را به مدت ماهها یا سالها بعد از عمل کارگذاری به همراه آسپرین و طبق نظر پزشک مصرف می کنید .

مهم است که حتی پس از آنکه احساس برطرف شدن مشکل را دارید به خوردن دارو ادامه دهید. بدون مشورت با پزشک مصرف این دارو را قطع نکنید .

علائم هشدار بیماران قلبی : علائم حمله قلبی یا سکتته جدید (مثل درد قفسه سینه/فک /دست چپ، تنگی نفس، تعریق غیر عادی، ضعف یک طرف بدن، اشکال در تکلم، تغییرات بینایی سریع، گیجی)سریعا به پزشک مراجعه کنید.

* پیش از عمل جراحی، درباره ی تمام داروهایی که مصرف میکنید به پزشک یا دندانپزشک اطلاع دهید(شامل داروهای تجویزی، داروهای غیر تجویزی، و محصولات گیاهی).پزشکتان به شما خواهد گفت که برای حداقل 5 روز قبل از عمل جراحی مصرف پلاویکس را قطع کنید . البته بدون صحبت با متخصص قلب خودسرانه مصرف این دارو را قطع نکنید.

- مصرف این دارو ممکن است باعث خونریزی معده شود .
- مصرف روزانه ی الکل در دوران مصرف این دارو خطر خونریزی معده را افزایش میدهد .مصرف نوشیدنیهای الکلی را محدود کنید .

- در دوران بارداری فقط در صورت نیاز مبرم باید از این دارو مصرف کرد .

- در صورت فراموش کردن یک دوز دارو اگر تا زمان دوز بعدی دارو ، بیشتر از 12 ساعت مانده بود دارو را مصرف کنید . ولی اگر تا زمان مصرف دوز بعدی کمتر از 12 ساعت مانده بود فقط داروی نوبت بعدی را در زمان معمول خود استفاده کنید.

* توجه داشته باشید هیچگاه برای جبران عدم مصرف دارو، مقدار آن را دو برابر نکنید.

*به تاریخ انقضای داروی کلوپیدوگرل توجه کنید و اگر دارویی که در دستتان است تاریخ انقضای آن تمام شده است، از مصرف آن خودداری کنید.

*هرگز داروی کلوپیدوگرل را به فرد دیگری حتی با علائم مشابه خودتان تجویز نکنید.

- از فعالیت هایی که خطر خونریزی یا جراحی را افزایش می دهد، پرهیز کنید .هنگام مسواک زدن یا اصلاح کردن بیشتر مراقب جلوگیری از زخم و خونریزی باشید.

-برای کاهش احتمال بریدن ، کبود شدن یا آسیب رساندن ، با اشیاء تیز مانند ریش تراش ها و برش ناخن و با احتیاط استفاده کنید.

- پلاویکس را می توانید با یا بدون غذا مصرف کنید .
- در دمای اتاق دور از نورو گرما و رطوبت نگهداری کنید
-از مصرف زیاد؛ همزمان این مواد با پلاویکس خودداری کنید:

*یونجه -آناناس-روغن گل مغربی-جنسینگ-انگور-سیر-زنجبیل - چای سبز-زردچوبه-ویتامین های مکمل محلول در چربی(A-D-E-K) آهن و فولات
-برای مصرف مکمل های ویتامینی و فراوردههای گیاهی با پزشک یا دارو ساز مشورت کنید.

-از خوردن گریپ فروت یا نوشیدن آب آن هنگامی که این دارو را مصرف میکنید اجتناب فرمایید مگر آنکه پزشک به شما گفته باشد خطری ندارد.
گریپ فروت میتواند اثر گذاری این دارو را کاهش دهد.